

Dictamen 148: Langosta roja (*Palinurus elephas*) en aguas occidentales del sur

1. Contexto


En el ámbito comunitario, la gestión de la langosta roja en el Atlántico nororiental se limita a una talla mínima de 9,5 cm (longitud cefalotorácica). Sin embargo, esta población, de gran interés económico para el sector, es objeto de medidas adicionales en los distintos Estados miembros (cuadro 1).

Medidas	Portugal	Francia	Espana
Talla mínima	11 CM	11 CM	9,5 CM
Prohibición individuos con huevos	✓	✓	✓
Marcas	✗	✓	✗
Cierre	✓ (01/10 –31/12)	✓ (01/01 –31/03)	✓*
Zonas de no pesca	✗	✓	✗
Metodo	Trampas: malla> 50 mm (Redes: 5% de captura secundaria)	Redes, Trampas	
Licencia		✓	

* País Vasco: 01/09 - 01/06
Cantabria: 15/09 - 30/04
Asturias: 15/09 - 30/04
Galicia: 01/10 - 31/12
**-48°02' N et 04°57' W -
48°05' N et 04°57' W-48°03'
N et 05°07'650 W longitude
de la bouée d'ARMEN-
48°04'N et 05°07'650 W

Cuadro 1 : Medidas establecidas para la langosta roja **en el Atlántico** para los Estados miembros del CC-Sur

En Francia, en particular, la langosta roja ha sido objeto de numerosos estudios y campañas de aprendizaje desde principios del 2000. De hecho, las referencias de esta especie emblemática de la costa atlántica revelan un fuerte descenso de su población desde la posguerra (fig. 1). Durante el 2000, los profesionales franceses adoptaron importantes medidas de gestión para intentar recuperar la población. La principal medida fue alzar la talla mínima de captura a 11 cm de cefalotórax, lo que permite garantizar que los ejemplares capturados se hayan reproducido al menos una vez antes de ser capturados.



<i>tonnes</i>	<i>toneladas</i>
<i>langouste rouge</i>	<i>langosta roja</i>
<i>mélange (rouge/homard)</i>	<i>mezcla (roja/bogavante)</i>
<i>homard</i>	<i>bogavante</i>

Fig.1: Producción nacional de langosta roja y bogavante europeo 1905-2001¹

Hasta 1947, el registro de capturas de langosta roja y bogavante variaba de un año a otro: a veces las dos especies estaban completamente separadas, a veces estaban parcialmente mezcladas y a veces estaban completamente agrupadas.

A día de hoy, los resultados indicados por Martial Laurans (IFREMER) son muy alentadores: con la aparición de procesos de reclutamiento muy buenos a partir de 2013-2014², y desde 2019, un aumento significativo de las capturas, así como una tasa muy alta de capturas de ejemplares jóvenes que aún no tienen talla comercial (liberados), se ha traducido en una buena situación del stock y una tendencia muy

¹ Latrouite Daniel, Lazure Pascal (2005). Estudio preparatorio para la recuperación de los niveles de recursos de la langosta real (*Palinurus elephas*) en el mar de Iroise. ACUERDO 04/2/210 729/YF ENTRE EL IFREMER Y EL CLPM DE AUDIERNE. <https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/1198/>

² Laurans Martial, Le Roy Didier, Miossec Dominique (2017). Proyecto FFP: Recuperación de la población de langosta roja (*Palinurus elephas*), resultados sobre ecología y biología a partir de los marcados de recaptura realizados por un grupo de pescadores profesionales voluntarios. RBE/STH/LBH/2017-03.



6 rue Alphonse Rio • 56100 Lorient
+33 297 83 11 69 • info@cc-sud.eu
www.cc-sud.eu

positiva para los próximos años. Por ello, los miembros franceses del CC-Sur desean, en consonancia con sus homólogos portugueses y españoles, generalizar las buenas prácticas. Los buenos resultados obtenidos en el ámbito local facilitan la comunicación de estas medidas más restrictivas a los agentes del sector y también a los institutos científicos, que, mediante la creación de programas adecuados, podrán apoyar a los profesionales y controlar la recuperación de la población.

2. Propuestas

Los miembros del CC-Sur proponen que la talla mínima de la langosta se alce a **11 cm** (longitud cefalotorácica, en lugar de 9,5 cm) en toda su zona de competencia (zonas CIEM 8abcd, 9a).

Esta homogeneización de la talla mínima permitiría una más amplia mejora del stock, pero también evitaría un efecto frontera. De hecho, empresas francesas desembarcan o envían los ejemplares de 9,5 cm a 11 cm a España, lo que en cierto modo y por desgracia legaliza las «malas prácticas francesas». Además, los ejemplares españoles de 9,5 cm se venden en los restaurantes franceses, amenazando los esfuerzos de los pescadores franceses.

Por tanto, este efecto frontera desestabiliza el mercado y debilita los esfuerzos realizados por los profesionales.

Para facilitar el control y el seguimiento de la langosta roja, pero también para responsabilizar a los pescadores de la pesca de esta especie, los miembros del CC-Sur proponen también que se realice un marcado sistemático (anillas) de los ejemplares desembarcados.

3. Conclusiones

Una talla mínima uniforme en toda la zona de responsabilidad del CC-Sur, combinada con un sistema de marcado, mejoraría el seguimiento y contribuiría al objetivo de reconstruir una población a mayor escala de una especie emblemática y con un importante potencial económico para la costa atlántica. Por ello, los miembros del CC-Sur piden a los Estados miembros a través de la regionalización y al Grupo de Estados Miembros Sur que tomen medidas necesarias en este sentido.

